arXiv:0912.0784v1 [math.AG] 4 Dec 2009

# Revêtements hyperelliptiques $d$-osculateurs et solitons elliptiques de la hiérarchie $KdV$

Armando Treibich
Faculté J.Perrin, rue J.Souvraz, SP18, 62300 Lens, France
Laboratoire de Mathématique de Lens, Université d'Artois
e-mail addresses : treibich@euler.univ-artois.fr ; treibich@cmat.edu.uy

**Résumé -** Soit $d$ un entier positif, $\mathbb{K}$ un corps algébriquement clos de caractéristique 0 et $X$ une courbe elliptique définie sur $\mathbb{K}$. On étudie les courbes hyperelliptiques munies d'une projection sur $X$, telles que l'image naturelle de $X$ dans la jacobienne de la courbe, oscule à l'ordre $d$ au plongement de celle-ci, en un point de Weierstrass. On construit des familles $(d-1)$-dimensionnelles de telles courbes, de genre $g$ arbitrairement grand, obtenant, en particulier, des familles $(g+d-1)$-dimensionnelles de solutions de la hiérarchie $KdV$, doublement périodiques par rapport à la $d$-ième variable.

**Abstract -** Let $d$ be a positive integer, $\mathbb{K}$ an algebraically closed field of characteristic 0 and $X$ an elliptic curve defined over $\mathbb{K}$ . We study the hyperelliptic curves equipped with a projection over $X$, such that the natural image of $X$ in the Jacobian of the curve osculates to order $d$ to the embedding of the curve, at a Weierstrass point. We construct $(d-1)$-dimensional families of such curves, of arbitrary big genus $g$, obtaining, in particular, $(g+d-1)$-dimensional families of solutions of the $KdV$ hierarchy, doubly periodic with respect to the $d$-th variable.

## Abridged english version

Let $\mathbb{K}$ be an algebraically closed field of characteristic 0 and let $\mathbb{P}^1$ denote the projective line over $\mathbb{K}$. By a curve we will mean hereafter a complete integral curve over $\mathbb{K}$, of arithmetic genus $g > 0$. For any curve $\Gamma$, let $\Gamma^o$ and Jac $\Gamma$ denote, respectively, the open subset of smooth points of $\Gamma$ and its generalized Jacobian. Recall that for any smooth point $p \in \Gamma^o$, the Abel morphism, $A_p : \Gamma^o \to \text{Jac } \Gamma$, $p' \mapsto O_\Gamma(p'-p)$, is an embedding and $A_p(\Gamma^o)$ generates the whole Jacobian. Moreover, the flag of hyperosculating spaces to $A_p(\Gamma^o)$ at $A_p(p) = 0$ can be constructed as follows. For any marked curve $(\Gamma, p)$ as above, and any positive integer $j$, let us consider the exact sequence of $O_\Gamma$-modules $0 \to O_\Gamma \to O_\Gamma(jp) \to O_{jp}(jp) \to 0$, as well as the corresponding long exact cohomology sequence :

$$0 \to H^o(\Gamma, O_\Gamma) \to H^o(\Gamma, O_\Gamma(jp)) \to H^o(\Gamma, O_{jp}(jp)) \xrightarrow{\delta} H^1(\Gamma, O_\Gamma) \to \dots,$$

where $\delta : H^o(\Gamma, O_{jp}(jp)) \to H^1(\Gamma, O_\Gamma)$ is the canonical cobord morphism and $H^1(\Gamma, O_\Gamma)$ is canonically identified to the tangent space to Jac $\Gamma$ at 0. According to the Weierstrass gap Theorem, for any $d = 1, \dots, g$ ($g$ being the arithmetic genus of $\Gamma$), there exists $0 < j < 2g$ such that $\delta(H^o(\Gamma, O_{jp}(jp)))$ is a $d$-dimensional subspace, denoted hereafter by $W_d$. For a generic point $p$ of $\Gamma$ we have $W_d = \delta(H^o(\Gamma, O_{dp}(dp)))$ (i.e. : $j = d$), but if $\Gamma$ is hyperelliptic and $p$ is a Weierstrass point, then we must choose $j = 2d - 1$.
In any case, the filtration $\{0\} \subsetneq W_1 \dots \subsetneq W_g = H^1(\Gamma, O_\Gamma)$ is the flag of hyperosculating spaces to $A_p(\Gamma)$ at 0.

Definition 1 (cf.[7])
*Let $\pi : (\Gamma, p) \to (X, q)$ be a finite marked morphism ($\pi(p) = q$) and let $\iota_\pi : X \to$ Jac $\Gamma$ denote the canonical (group homo-)morphism $q' \mapsto A_p(\pi^*(q' - q))$. We will say that $\pi$ is a $d$-osculating cover iff the tangent to $\iota_\pi(X)$ at 0 is contained in $W_d$ but not in $W_{d-1}$. If, moreover, $\Gamma$ is a degree-2 cover of $\mathbb{P}^1$ ramified at $p$, we will call $\pi$ a hyperelliptic $d$-osculating cover.*

Remark 2
Besides its intrinsic geometric interest, the above definitions are motivated, when $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, by the following result : any hyperelliptic $d$-osculating cover of genus $g$ gives rise to a $g$-dimensional family of exact solutions of the Korteweg-de Vries equation, doubly periodic with respect to the $d$-th $KdV$ flow (cf.[3],[4],[6],[5]).

Definition 3 (cf.[8])

1. *Let $E$ denote the unique indecomposable rank-2, degree-0 vector bundle over $X$ and $S := \mathbb{P}(E)$ the corresponding projective bundle. The natural projection $\pi_s : S \to X$ is then a ruled surface over $X$, characterized up to an isomorphism, by the existence of a unique section, $C_o \subset S$, of self-intersection $C_o.C_o = 0$.*
2. *The canonical symmetry of $(X, q), [-1] : X \to X$, fixes its origin, $\omega_o := q$, as well as the three other half-periods $\{\omega_j, j = 1, 2, 3\}$, and lifts to an involution $\tau : S \to S$ (i.e. : $\pi_s \circ \tau = [-1] \circ \pi_s$) having two fixed points over each $\omega_i$ ($i = 0, \dots, 3$) : one in $C_o$, denoted by $s_i$, and the other one denoted by $r_i$.*
3. *Let $e : S^\perp \to S$ denote the blow-up of $S$ at $\{s_i, r_i, i = 0, \dots, 3\}$, the eight fixed points of $\tau$, and $\tau^\perp : S^\perp \to S^\perp$ its lift to an involution fixing the corresponding*

*exceptional divisors* $s_i^\perp, r_i^\perp, i = 0, \ldots, 3$. *Then, the quotient* $\tilde{S} := S^\perp/\tau^\perp$ *is a smooth rational surface and the canonical degree-2 projection* $\psi : S^\perp \to \tilde{S}$ *is ramified along* $s_i^\perp, r_i^\perp, i = 0, \ldots, 3$.

- The following results, already known for $d = 1$ (cf.[8]) and $d = 2$ (cf.[1]), can be proven within the same framework for any $d > 2$.

Proposition 4 (cf.[7])
*Let* $\pi : (\Gamma, p) \to (X, q)$ *be a hyperelliptic* $d$*-osculating cover of degree* $n$ *and let* $\rho$ *denote its ramification index at* $p$. *Then* $\rho$ *is odd, bounded by* $2d-1$, *and there exists a unique morphism* $\iota^\perp : \Gamma \to S^\perp$ *such that :*

1. *the surjective morphism* $\iota^\perp : \Gamma \to \iota^\perp(\Gamma)$ *factors* $\pi = \pi_s \circ e \circ \iota^\perp$ *and its degree divides* $2d - 1$ ;
2. *the curve* $\iota^\perp(\Gamma)$ *is* $\tau^\perp$*-invariant and projects into* $\tilde{S}$, *with degree* 2 *over the rational curve* $\tilde{\Gamma} := \varphi(\iota^\perp(\Gamma))$ ;
3. *the direct image divisor* $(e \circ \iota^\perp)_*(\Gamma)$ *is linearly equivalent to* $nC_o + (2d-1)S_o$ *and only intersects* $C_o$ *at* $(e \circ \iota^\perp)(p) = C_o \cap S_o$ ;
4. *for any* $i = 0, \ldots, 3$ *let* $\gamma_i$ *denote the intersection multiplicity number between the direct image divisor* $(\iota^\perp)_*(\Gamma)$ *and* $r_i^\perp$. *Then* $(\iota^\perp)_*(\Gamma)$ *is linearly equivalent to* $e^*(nC_o + (2d-1)S_o) - \rho s_o^\perp - \Sigma_i \gamma_i r_i^\perp$.

Definition 5
*Let* $\gamma := (\gamma_i) \in \mathbb{N}^4, \gamma_i := (\iota^\perp)_*(\Gamma).r_i^\perp (i = 0, \ldots, 3)$ *be the intersection multiplicity vector canonically associated to the hyperelliptic* $d$*-osculating cover* $\pi : (\Gamma, p) \to (X, q)$. *We will call* $\gamma$ *the type of* $\pi$ *and denote hereafter by* $\gamma^{(1)}$ *and* $\gamma^{(2)}$ *the sums* $\gamma^{(1)} := \Sigma_i \gamma_i$ *and* $\gamma^{(2)} := \Sigma_i \gamma_i^2$, *respectively.*

Theorem 6
*Let* $\pi : (\Gamma, p) \to (X, q)$ *be a hyperelliptic* $d$*-osculating cover, of degree* $n$, *type* $\gamma$, *ramification index* $\rho$ *at* $p$ *and arithmetic genus* $g$. *Then :*

1. $\gamma_o + 1 \equiv \gamma_1 \equiv \gamma_2 \equiv \gamma_3 \equiv n \ (mod.2)$ ;
2. $2g + 1 \leq \gamma^{(1)}$ *and* $\gamma^{(2)} \leq (2d-1)(2n-2) + 4 - \rho^2$.

- Let us fix hereafter $k \in \{0, 1, 2, 3\}$ and choose $\varepsilon = (\varepsilon_i) \in \mathbb{Z}^4$ such that, either $|\varepsilon_i| = (d-1)(1 - \delta_{i,k})$, for any $i = 0, \ldots, 3$, or $|\varepsilon_i| = [d/2] - (-1)^d \delta_{i,k}$, for any $i = 0, \ldots, 3$. We prove the

Theorem 7

*For any* $\mu \in \mathbb{N}^4$ *such that* $\mu_o + 1 \equiv \mu_j (mod.2)(j = 1, 2, 3)$ *and* $\gamma := (2d-1)\mu + 2\varepsilon \in \mathbb{N}^4$, *there exists a* $(d-1)$*-dimensional family of smooth hyperelliptic* $d$*-osculating covers of genus* $g := 1/2\{(2d-1)\mu^{(1)} + 2\varepsilon^{(1)} - 1\}$, *degree* $n := \frac{1}{2}\big\{(2d-1)\mu^{(2)} + 4\Sigma_i \mu_i \varepsilon_i + 6d - 7\big\}$ *and type* $\gamma$ .

**Version française**

1.1 Soit $\mathbb{K}$ un corps algébriquement clos de caractéristique 0, $(X, q)$ une courbe elliptique définie sur $\mathbb{K}$, pointée en son origine, et notons $\mathbb{P}^1$ la droite projective sur $\mathbb{K}$. Sauf mention contraire, toutes les courbes considérées par la suite seront supposées définies sur $\mathbb{K}$, complètes, intègres et de genre arithmétique positif. Etant donnée une telle courbe $\Gamma$, munie du choix d'un point lisse $p \in \Gamma$, on désignera par $A_p : \Gamma \to \mathrm{Jac}\Gamma$ l'application (rationnelle) d'Abel.

Proposition 1.2 (cf.[7]§1.6)

*Soit* $\Gamma$ *une courbe hyperelliptique de genre positif* $g$, $p$ *un point lisse de Weierstrass de* $\Gamma$ *et considérons, quel que soit le nombre impair* $j = 2d - 1 < 2g$, *la suite exacte de* $O_\Gamma$*-modules* $0 \to O_\Gamma \to O_\Gamma(jp) \to O_{jp}(jp) \to 0$, *ainsi que sa suite exacte longue de cohomologie*

$0 \to H^o(\Gamma, O_\Gamma) \to H^o(\Gamma, O_\Gamma(jp)) \to H^o(\Gamma, O_{jp}(jp)) \xrightarrow{\delta} H^1(\Gamma, O_\Gamma) \to \ldots,$

*où* $\delta$ *est l'application cobord. Alors* $W_d = \delta(H^o(O_{jp}(jp)))$ *est le* $d$*-ième sous-espace osculateur à* $A_p(\Gamma)$ *en* 0.

Définition 1.3

*Soit* $\pi : (\Gamma, p) \to (X, q)$ *un revêtement ramifié de la courbe elliptique* $(X, q), p$ *un point lisse de* $\Gamma$ *tel que* $\pi(p) = q$ *et notons* $\iota_\pi : (X, q) \to (Jac\Gamma, 0)$ *l'homomorphisme de groupes algébriques,* $q' \mapsto A_p(\pi^*(q' - q))$. *Nous dirons que* $\pi$ *est un revêtement hyperelliptique* $d$*-osculateur* $(d > 0)$ *si et seulement s'il satisfait les propriétés ci-après :*

1. $\Gamma$ *est un revêtement double de* $\mathbb{P}^1$, *ramifié en* $p$ ;
2. *la tangente à* $\iota_\pi(X)$ *en* 0 *est contenue dans* $W_d$ *mais pas dans* $W_{d-1}$.

Définition 1.4 (cf.[8])

1. *Soit* $\pi_s : S \to X$ *l'unique surface réglée au dessus de* $X$, *ayant une seule section,* $C_o \subset S$, *d'auto-intersection nulle. La symétrie canonique de* $(X, q), [-1]$ :

*$X \to X$, fixe l'origine $\omega_o := q$ ainsi que les trois autres demi-périodes $\{\omega_j, j = 1,2,3\}$, et se remonte en une involution de $S$, notée $\tau : S \to S$ ($\pi_s \circ \tau = [-1] \circ \pi_s$), ayant deux points fixes au dessus de chaque $\omega_i (i = 0, \ldots, 3)$ : un sur $C_o$, noté $s_i$, et l'autre noté $r_i$.*

2. *Soit d'autre part $e : S^\perp \to S$ l'éclatement des huit points $\{s_i, r_i\} \subset S$ et notons $\{s_i^\perp, r_i^\perp\}$ les diviseurs exceptionnels correspondants. Alors $\tau : S \to S$ se remonte à son tour en une involution $\tau^\perp : S^\perp \to S^\perp (e \circ \tau^\perp = \tau \circ e)$.*
3. *Il s'en suit que la surface quotient $\tilde{S} := S^\perp / \tau^\perp$ est lisse et que le revêtement double associé, $\varphi : S^\perp \to \tilde{S}$, est ramifié le long des courbes $\{s_i^\perp, r_i^\perp\}$.*

- Les projections $\pi_s^\perp := \pi_s \circ e : S^\perp \to X$ et $\varphi : S^\perp \to \tilde{S}$, donnent un cadre universel pour les revêtements hyperelliptiques $d$-osculateurs ($d > 0$) et permettent de démontrer la proposition 1.6 et le Théorème 1.9 ci-dessous, de façon analogue aux cas particuliers $d = 1$, $d = 2$ et $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ (cf.[8],[1]).

Proposition 1.5 (cf.[8],[1],[2])

*Soit $\pi : (\Gamma, p) \to (X, q)$ un revêtement hyperelliptique $d$-osculateur de degré $n$ et notons $\rho$ son indice de ramification en $p$. Alors $\rho$ est un nombre impair majoré par $2d - 1$ et il existe un unique morphisme $\iota^\perp : \Gamma \to S^\perp$ tel que :*

1. *la courbe image $\iota^\perp(\Gamma) \subset S^\perp$ est $\iota^\perp$- invariante et sa projection, $\tilde{\Gamma} := \varphi(\iota^\perp(\Gamma))$, est une courbe rationnelle irréductible de $\tilde{S}$ ;*
2. *$\pi$ se factorise via $\iota^\perp$, $\pi = \pi_s \circ e \circ \iota^\perp$, et $deg(\iota^\perp : \Gamma \to \Gamma^\perp)$ divise $2d - 1$ ;*
3. *le diviseur image directe $(e \circ \iota^\perp)_*(\Gamma)$ est linéairement équivalent à $nC_o + (2d - 1)S_o$ et n'intersecte $C_o$ qu'au point $(e \circ \iota^\perp)(p) = C_o \cap S_o$ ;*
4. *Le diviseur $(\iota^\perp)_*(\Gamma)$ est linéairement équivalent à $e^*(nC_o + (2d-1)S_o) - \rho s_o^\perp - \Sigma_i \gamma_i r_i^\perp$, où, pour tout $i = 0, \ldots, 3$, $\gamma_i := \iota_*^\perp(\Gamma).r_i^\perp$ .*

Définition 1.6

*Le vecteur $\gamma = (\gamma_i) \in \mathbb{N}^4$, $\gamma_i := (\iota^\perp)_*(\Gamma).r_i^\perp$, canoniquement associé au revêtement hyperelliptique $d$-osculateur $\pi$, sera appelé le type de $\pi$. Nous désignerons dorénavant, par $\gamma^{(1)}$ et $\gamma^{(2)}$ les sommes $\Sigma_i \gamma_i$ et $\Sigma_i \gamma_i^2$, respectivement.*

Theorème 1.7

*Soit $\pi : (\Gamma, p) \to (X, q)$ un revêtement hyperelliptique $d$-osculateur, de degré $n$, type $\gamma$, genre arithmétique $g$ et notons $\rho$ son indice de ramification en $p$. Alors :*

1. $\gamma_o + 1 \equiv \gamma_1 \equiv \gamma_2 \equiv \gamma_3 \equiv n(mod.2)$ ;
2. $2g + 1 \leqslant \gamma^{(1)}$ *et* $\gamma^{(2)} \leqslant (2d-1)(2n-2) + 4 - \rho^2$.

- Au moyen des critères d'existence et d'irréductibilité ci-après, nous construisons finalement, pour tout $n$ et pour $g$ arbitrairement grand, une famille de dimension $d-1$ de tels revêtements, de degré $n$ et genre $g$.

Proposition 1.8 (cf.[8]§6.2)
*Soit $k \in \{0,1,2,3\}$ et $\alpha = (\alpha_i) \in \mathbb{N}^4$ tel que $\alpha_k + 1 \equiv \alpha_j (mod.2)$, quel que soit $j \neq k$. Alors, il existe une unique courbe irréductible tracée dans $S^\perp$, notée ci-après $Z_\alpha^\perp$, qui soit $\tau^\perp$-invariante et linéairement équivalente à $e^*(nC_o + S_k) - s_k^\perp - \Sigma_i \alpha_i r_i^\perp$, où $n := 1/2(-1 + \Sigma_i \alpha_i^2)$.*

Proposition 1.9 (cf.[7]§3.4)
*Soit $\Gamma$ un diviseur effectif de la surface $S$, lisse en $s_o$ et tel que $\Gamma \cap C_o = s_o$. Alors $\Gamma$ est une courbe irréductible.*

Proposition 1.10
*Soit $C_o^\perp$ le transformé strict de $C_o$ dans $S^\perp$ et $\Gamma^\perp$ un diviseur effectif de $S^\perp$ satisfaisant les propriétés suivantes :*

1. *la courbe $\Gamma^\perp$ intersecte $C_o^\perp$ uniquement au point $p_o^\perp := C_o^\perp \cap s_o^\perp$ et son support ne contient aucune des courbes dans $\{C_o^\perp, s_i^\perp, r_i^\perp, i = 0, \ldots, 3\}$ ;*
2. *quel que soit $i = 0, \ldots, 3$, $deg(\Gamma^\perp . s_i^\perp) = \delta_{i,0}$ .*

*Alors $\Gamma^\perp$ est une courbe irréductible .*
Preuve
La propriété 1.10.1. nous assure que $\Gamma^\perp$ est le transformé strict de $\Gamma := e_*(\Gamma^\perp)$, son image directe par $e : S^\perp \to S$, et que celle-ci ne contient pas $C_o$. On vérifie également, grâce aux autres propriétés, que $\Gamma$ est lisse en $s_o$ et que $\Gamma \cap C_o = s_o$. Il s'en suit, d'après [7]§3.4, que $\Gamma$ est une courbe irréductible, de même que $\Gamma^\perp$, son transformé strict.■

Theorème 1.11
*Fixons $d \in \mathbb{N}$, $\mu = (\mu_i) \in \mathbb{N}^4$ tel que $\mu_o + 1 \equiv \mu_1 \equiv \mu_2 \equiv \mu_3 (mod.2)$ et choisissons $\varepsilon \in \mathbb{Z}^4$ égal, à moins d'une permutation ou d'un changement des signes des coefficients, soit à $\varepsilon = (0,\ 2d-2,\ 2d-2,\ 2d-2)$, soit à $\varepsilon = (d-2, d, d, d)$ si $d$ est pair ou à $\varepsilon = (d+1,\ d-1,\ d-1,\ d-1)$ si $d$ est impair. Notons $\gamma := (2d-1)\mu + \varepsilon$ et*

*soit $n \in \mathbb{N}^*$ l'unique naturel positif tel que $\gamma^{(2)} := \Sigma_i \gamma_i^2 = (2d-1)(2n-2)+3$. Alors, le système linéaire $\mid e^*(nC_o + (2d-1)S_o) - s_o^\perp - \Sigma_i \gamma_i r_i^\perp \mid$ contient un sous-espace de dimension $(d-1)$, dont l'élément générique est une courbe irréductible, $\tau^\perp$-invariante et lisse au point $p_o^\perp := C_o^\perp \cap s_o^\perp$, telle que sa projection dans $\tilde{S}$ est isomorphe à $\mathbb{P}^1$.*

Corollaire 1.12
*Soient $\gamma \in \mathbb{N}^4$ et $n \in \mathbb{N}$ (où $\gamma^{(2)} = (2d-1)(2n-2)+3)$) comme ci-dessus. Il existe alors une famille $(d-1)$-dimensionnelle de revêtements hyperelliptiques $d$-osculateurs, de degré $n$, type $\gamma$ et non-singuliers de genre $g := 1/2(-1+\gamma^{(1)})$.*

Preuve du Théorème.
Pour des raisons d'espace nous allons construire uniquement la famille associée à $\gamma = (2d\text{-}1)\mu + (0,\ 2d\text{-}2,\ 2d\text{-}2,\ 2d\text{-}2)$, auquel cas le degré $n$ correspondant est tel que $2n = (2d\text{-}1)\mu^{(2)} + 4(d\text{-}1)(\mu_1+\mu_2+\mu_3) + 6d - 7$ .
Soient $\mu(1) := \mu + (0,0,1,1)$, $\mu(2) := \mu + (0,1,0,1)$, $\mu(3) := \mu + (0,1,1,0)$, et notons, d'après 1.11 ci-dessus, $Z_{(k)}^\perp (k=1,2,3)$ l'unique courbe $\tau^\perp$-invariante de $S^\perp$, telle que $Z_{(k)}^\perp \sim e^*(m(k)C_o + S_k) - s_k^\perp - \Sigma_i \mu(k)_i r_i^\perp$, où $2m(k)+1 = \Sigma_i \mu(k)_i^2$.
Soient d'autre part $\mu^+ := \mu + (1,1,1,1)$, $\mu' := \mu + (0,2,1,1)$, et notons $Z_+^\perp, Z'^\perp$, les uniques courbes $\tau^\perp$-invariantes de $S^\perp$, linéairement équivalentes à :

1. $Z_+^\perp \sim e^*(m^+C_o + S_o) - s_o^\perp - \Sigma_i \mu_i^+ r_i^\perp$, où $2m^+ + 1 = \mu^{+(2)}$ ;
2. $Z'^\perp \sim e^*(m'C_o + S_o) - s_1^\perp - \Sigma_i \mu_i' r_i^\perp$, où $2m' + 1 = \mu'^{(2)}$.

De même, si $\mu_o \neq 0$ on note $\mu^- := \mu + (-1,1,1,1)$ et $Z_-^\perp$ l'unique courbe $\tau^\perp$-invariante de $S^\perp$, telle que $Z_-^\perp \sim e^*(m^-C_o + S_o) - s_o^\perp - \Sigma_i \mu_i^- r_i^\perp$, où $2m^- + 1 = \mu^{-(2)}$.
Par contre, si $\mu_o = 0$ on notera $Z_-^\perp := Z_+^\perp + 2r_o^\perp$, de telle sorte que dans les deux cas de figure, les diviseurs $D_o^\perp := Z_+^\perp + Z_-^\perp + 2s_o^\perp$ et $D_1^\perp := Z'^\perp + Z_{(1)}^\perp + 2s_1^\perp$ soient linéairement équivalents.
Considérons finalement la courbe $Z^\perp \sim e^*(mC_o + S_o) - s_o^\perp - \Sigma_i \mu_i r_i^\perp$ où $2m+1 = \Sigma_i \mu_i^2$ et remarquons les faits suivants :

1. tout élément $\tau^\perp$-invariant de $\Lambda$ est l'image réciproque par $\varphi : S^\perp \to \tilde{S}$, d'un diviseur de genre arithmétique nul de $\tilde{S}$ ;
2. le diviseur $F_j^\perp := C_o^\perp + \Sigma_{k\neq 0}(Z_{(k)}^\perp + s_k^\perp) + jD_o^\perp + (d-2-j)D_1^\perp$, pour tout $j = 0, \ldots, d-2$, ainsi que $G^\perp := Z^\perp + (d-1)D_o^\perp$, appartiennent à $\Lambda$ ;
3. les diviseurs $\{F_j^\perp, j = 0, \ldots, d-2\}$ ont $C_o^\perp$ comme unique composante irréductible commune, mais $F_o^\perp$ est le seul à être lisse au point $p_o^\perp := C_o^\perp \cap s_o^\perp$.

En particulier ils engendrent un sous-espace $(d-2)$-dimensionnel de $\Lambda$, dont l'élément générique est transverse à $s_o^\perp$ en $p_o^\perp$ ;

4. le diviseur $G^\perp$ intersecte $C_o^\perp$ uniquement au point $p_o^\perp$.

Il en résulte que $\{G^\perp, F_j^\perp, j = 0, \ldots, d-2\}$ engendre un sous-espace $(d-1)$-dimensionnel et $\tau^\perp$-invariant de $\Lambda$, dont l'élément générique satisfait le critère d'irréductibilité 1.10 et se projette dans $\tilde{S}$ sur une courbe isomorphe à $\mathbb{P}^1$. ■

Preuve du Corollaire :
Soit $\Gamma^\perp$ l'élément générique du sous-espace de $\Lambda$ construit ci-haut. On sait, d'après le Théorème 1.11, que $\varphi : \Gamma^\perp \to \tilde{\Gamma}$ est un revêtement de degré 2, ramifié en $p_o^\perp$, dont l'image est isomorphe à $\mathbb{P}^1$. Donc $\Gamma^\perp$ est une courbe hyperelliptique et $p_o^\perp \in \Gamma^\perp$ est un point de Weierstrass de $\Gamma^\perp$. Il s'en suit que la projection naturelle de $(\Gamma^\perp, p_o^\perp)$ sur $(X, q)$ (restriction de $\pi_s^\perp : S^\perp \to X$ à $\Gamma^\perp$), est un revêtement hyperelliptique $d$-osculateur de type $\gamma$, degré $n$ et genre $g$, tel que $(2n-2)(2d-1)+3 = \gamma^{(2)}$ et $2g+1 = \gamma^{(1)}$. ■

# Références


[1] Flédrich P., *Paires 3-tangentielles hyperelliptiques et solutions doublement périodiques en t de l'équation de K-deV,* Thèse Univ. d'Artois (12/2003).

[2] Flédrich P. & Treibich A., *Hyperelliptic osculating covers and KdV solutions periodic in t,* I.M.R.N., 2006, N$^o$5 (2006), Article ID 73476, 1-17.

[3] Krichever I.M., *Elliptic solutions of the KP equation and integrable systems of particles*, Funct. Anal., 14, N$^o$4 (1980), 45-54.

[4] Its A.R. & Matveev V., *Hill's operator, finite number of lacunae and multisoliton solutions of the K-deV equation*, Teor.Mat.Fiz 23 (1975), 51-67.

[5] Segal G. & Wilson G., *Loop groups and equations of KdV type*, Publ. Math. IHES, 61 (1985), 5-65.

[6] Smirnov A.O., *Solutions of the KdV equation, elliptic in t*, Teor. Mat.Fiz. 100, N$^o$2 (1994), 937-947.

[7] Treibich A. *Matrix elliptic solitons*, Duke Math.J., 90, N$^o$3 (1997), 523-547.

[8] Treibich A. & Verdier J.-L., *Solitons Elliptiques*, Prog. in Math., 88. (app.by J.Oesterlé), *The Grothendieck Festschrift*, Ed. : Birkhäuser (1990), 437-479.